

Anexo 1. Encuesta realizada para analizar los conocimientos de los padres sobre la prevención del síndrome de muerte súbita del lactante en la primera visita en el centro de salud tras el alta hospitalaria

1. Quién rellena la encuesta:	
	Padre
	Madre
2. Edad del padre	
3. Edad de la madre	
4. ¿Tiene otros hijos/as?	
	No
	Sí, uno
	Sí, dos
	Sí, tres
	Sí, más de tres
5. ¿Cuál es su nivel de estudios?	
	Escolar básico
	ESO
	Bachillerato
	Carrera universitaria
	Doctorado
6. El nacimiento del recién nacido, ¿fue en un hospital público o privado?	
	Público
	Privado
7. ¿Cómo cree que deben dormir los lactantes para disminuir el riesgo de muerte súbita?	
	Es indiferente la forma en que duermen
	Bocarriba
	Bocabajo
8. ¿Cuál de estas medidas considera que disminuye el riesgo de muerte súbita?	
Puede haber varias respuestas correctas	
	Evitar el humo del tabaco
	Alimentar con lactancia materna
	Compartir la cama los padres con el recién nacido (colecho)
	Compartir la habitación sin compartir la cama
	Usar un colchón blando en la cuna del bebé
	Usar almohada o cojines
	Usar dispositivos antivuelco
	Usar chupete